

# چرا طفل من واکسین کوید-۱۹ شود؟

واکسین در وقایه طفل از مصاب شدن به مرض کوید-۱۹ کمک می کند.  
واکسین انتشار مرض کوید-۱۹ را کم کرده و جامعه را حفاظت مینماید.

## آیا واقعا اطفال حالا به واکسین نیاز دارند؟

بلی، خطر مصاب شدن به مرض کوید-۱۹ تا فعلا بالا است. هر قدر زودتر اطفال واکسین گردند، به همان اندازه حفاظت میشوند.



## طفل ۵ - ۱۱ سال من کدام واکسین را خواهد گرفت؟

در کانادا اطفال سنین ۵-۱۱ سال مقدار کم واکسین فایزر- بایونتک میگیرند (۱۰ میکروگرام ، یک برسوم مقدار واکسین که به نوجوانان و بزرگ سالان تطبیق میگردد). مقدار کم واکسین در اطفال مثر واقع می گردد زیرا سیستم معافیتی اطفال قویتر نسبت به بزرگ سالان است. و اطفال باید دو بار واکسین گردند.



## آیا واکسین کوید-۱۹ برای اطفال محفوظ و بدون خطر است؟

اداره صحت کانادا، تعداد زیاد ساینس دانان و محققین شواهد موجوده طبی را بطور دقیق و محتاطانه تحت مطالعه قرار داده اند و هیچ نوع تشویش عمده در مورد این واکسین ابراز نه نموده اند. زیادتیر عوارض جانبی واکسین کوید-۱۹ مشابه عوارض جانبی خفیف دیگر واکسین ها بوده، مانند درد در ناحیه واکسین شده، خستگی، درد اعضای بدن، سردردی، و تب ولرز. این عوارض جانبی بعد از مدت چندین روز شفا میگردد و از بین میروند.



در واقعات نادر یک تعداد نوجوانان و بزرگ سالان التهاب عضله قلبی (مایوکاردیت) را بعد از گرفتن واکسین کوید-۱۹ تجربه نموده و یا هم نزد شان التهاب پرده که سطح بیرونی قلب را پوشانیده (پیری کاردیت) گردیده است که اکثر این وقایع بعد از مدت چندین روز شفایاب گردیده اند. در مطالعات که بالای اطفال سنین ۵-۱۱ سال که واکسین کوید-۱۹ را گرفته است هیچ واقعه مصابیت قلب دیده نه شده. مصاب شدن به مرض کوید-۱۹ امکان دارد بیشتر باعث التهاب شدن قلب نسبت به واکسین گردد.

واکسین کوید-۱۹ اطفال را کمک میکند تا در مکتب باقی بمانند و وقت خویش را با دوستان شان سپری کنند. طفل تانرا هر قدر زودتر میتوانید واکسین نمایید.

دقیق از ۳ دسامبر ۲۰۲۱

{ REFUGEE } 613



Funded by:

Financé par :

OCASI  
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants

WCHI  
WOMEN'S COLLEGE HOSPITAL  
Healthcare | REVOLUTIONIZED



Immigration, Refugees  
and Citizenship Canada

Immigration, Réfugiés  
et Citoyenneté Canada